



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

Leczenie zabiegowe wysiłkowego nietrzymania moczu

W zależności od stopnia zaawansowania wysiłkowego nietrzymania moczu, możliwe są do zastosowania zarówno procedury małoinwazyjne, jak i chirurgiczne. Te drugie często wiążą się z leczeniem operacyjnym statyki narządu rodnegu oraz zabiegowym plastyki pochwy. Celem terapii jest przywrócenie komfortu życia codziennego.

Warianty usługi:

- Leczenie nadreaktywnego pęcherza moczowego
- Chirurgiczne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu, TVT
- Laserowe obkurczanie pochwy
- Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu z wykorzystaniem kwasu hialuronowego

Leczenie nadreaktywnego pęcherza moczowego

Ostrzyknięcie ścian pęcherza moczowego toksyną botulinową typu A w leczeniu nadreaktywnego pęcherza moczowego.

Neutotoksyna botulinowa typu A jest jednym z najnowocześniejszych leków stosowanych w medycynie. Toksyna botulinowa typu A (BOTOX®) jest zalicencjonowana w Europie do leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego opornego na terapie zachowawcze (tj. farmakoterapia doustna).

Nadreaktywność pęcherza moczowego wiąże się z pogorszeniem jakości życia, Pacjenci skarżą się na silne napady parć naglących, konieczność natychmiastowego i bardzo częstego udawania się do toalety, nierzadko również w nocy. Często przy nasilonych objawach pojawia się nietrzymanie moczu, czyli wyciek moczu wbrew woli pacjenta. Leczenie metodą ostrzykiwania pęcherza



KOSZT:
4000 zł



CZAS:
1 - 1,5h



OBSZAR:
pęcherz



ZNIECZULENIE:
miejscowe



LICZBA ZABIEGÓW:
indywidualnie



ODSTĘPY POMIĘDZY ZABIEGAMI:
6-12 m-cy



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

Botoxem pozwala:

- wyleminować lub ograniczyć nietrzymanie moczu
- ograniczyć skurcze pęcherza moczowego i parcia naglące
- zwiększyć ilość moczu, którą może pomieścić pęcherz moczowy
- zmniejszyć uczucie konieczności nagłego udania się do toalety
- wydłużyć odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi mikcjami

Usługa dokonywana w:

 Szpital LUX MED Puławska

Chirurgiczne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu, TVT

Zabieg operacyjny polega na podwieszeniu środkowego odcinka cewki moczowej za pomocą specjalnej, beznapięciowej taśmy polipropylenowej bądź siatki, umożliwiając tym odtworzenie fizjologicznego kąta pęcherzowo-cewkowego. Procedura ma na celu korektę elementów podwieszających macicę, pęcherz oraz cewkę moczową. Zabieg wykonywany jest w przypadkach pierwotnego i nawrotowego nietrzymania moczu. Efekt odczuwalny jest od razu. Niekiedy zabieg przeprowadza się drogą pochwową, wykonując jednoczesną plastykę pochwy, zmniejszając jej szerokość i wiotkość. Procedury nie wykonuje się u kobiet, które nie zakończyły jeszcze prokreacji.

Usługa dokonywana w:

 Szpital LUX MED Puławska



GRUPA WIEKOWA:
25+



CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:
80 min



ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:
3



CZAS HOSPITALIZACJI:
do 6h



CZAS:
40 min



ZNIECZULENIE:
ogólne,
podpajęczynówkowe



GRUPA WIEKOWA:
35+



ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:
4



CZAS HOSPITALIZACJI:
1 doba



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

Laseroowe obkurczanie pochwy

Laserooterapia pochwy polega na wykonywaniu spiralnych ruchów głowicy lasera przez całą długość pochwy. Wiązka lasera powoduje mikrouszkodzenia w śluzówce narządu, wymuszając naturalną regenerację. Efektem procedury jest zwężenie pochwy, redukcja problemu suchości oraz wzrost satysfakcji seksualnej. Laser stosuje się również w okolicach cewki, lecząc wysiłkowe nietrzymanie moczu. Zabieg jest bezpieczny i bezbolesny. Zaleca się wykonanie serii 2-3 zabiegów.

Usługa dokonywana w:

 Szpital LUX MED Puławska



CZAS:
10 min



OBSZAR:
strefy intymne



ZNIECZULENIE:
ew. maść



LICZBA ZABIEGÓW:
2-4



ODSTĘPY POMIĘDZY ZABIEGAMI:
4 tygodnie



GRUPA WIEKOWA:
35+



CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:
30 min



ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:
1

Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu z wykorzystaniem kwasu hialuronowego

Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu kwasem hialuronowym polega na jego iniekcji w okolice cewki moczowej, dzięki czemu zmianie ulega kąt okołocewkowy. Procedura ma zastosowanie przy początkowym stadium nietrzymania moczu. Najczęściej wykonuje się ją w połączeniu z laseroterapią pochwy, rewitalizując zarówno samą pochwę, jak i okolice cewki moczowej.



CZAS:
30 min



OBSZAR:
strefy intymne



ZNIECZULENIE:
miejscowe w postaci maści



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

Usługa dokonywana w:

 Szpital LUX MED Puławska



LICZBA ZABIEGÓW:

2-4



GRUPA WIEKOWA:

35+



ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

3

Jak przygotować się do zabiegu?

Zabiegi leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu przeprowadzane są przez ginekologa plastyka lub urologa po wcześniejszej konsultacji i kwalifikacji. W zależności od konkretnego przypadku stosuje się różne formy znieczulenia. Większość zabiegów wysiłkowego nietrzymania moczu wykonuje się w ramach chirurgii jednego dnia. Istnieje możliwość połączenia kilku procedur ginekologii plastycznej w trakcie jednego zabiegu – o ile lekarz nie zaleci inaczej. Po operacji zaleca się minimum 7 dni rekonwalescencji w warunkach domowych. Pełen okres rekonwalescencji trwa 4-6 tygodni. Po tym czasie można wrócić do aktywności fizycznej i seksualnej. Zabiegu nie wykonuje się w trakcie miesiączki – pamiętaj o tym, planując termin wykonania procedury.



WSKAZANIA

Wskazaniem do leczenia jest mimowolne, wysiłkowe popuszczanie moczu podczas takich aktywności jak: kichanie, kasłanie czy skakanie.



PRZYGOTOWANIA

Na kilka dni przed zabiegiem należy odstawić leki rozrzedzające krew. W dniu zabiegu zgłoś się na 20 minut przed wyznaczoną godziną. Zabierz ze sobą wyniki badań krwi oraz badań urodynamicznych, o ile były zlecane.



PRZECIWWSKAZANIA

Bezwzględny przeciwwskazaniem do zabiegowego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu są: ciąża i okres laktacji, nieprawidłowy wynik cytologii, schorzenia, w tym infekcje ginekologiczne wymagające leczenia w pierwszej kolejności, część chorób autoimmunologicznych, nieregulowane choroby przewlekłe, uzależnienie od alkoholu i środków psychoaktywnych, duża skłonność do powstawania bliznowców lub nierealistyczne oczekiwania pacjentki co do możliwych do uzyskania efektów zabiegu.

Przeciwwskazaniem do zabiegu są również: ogólny zły stan zdrowia, odchylenia w badaniach



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

kontrolnych krwi, infekcja, w tym infekcje wirusowe, jak opryszczka.



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455