



Plastyka okolic łechtaczki

Łechtaczka odgrywa ważną funkcję w trakcie stosunku seksualnego. Dzięki wysokiemu unerwieniu i podatności na stymulację jest odpowiedzialna za jego jakość i intensywność. U części Pacjentek jest przysłonięta fałdem skórny, co ogranicza podatność na bodźce. Drobną korektą przywraca jej funkcje i jakość życia seksualnego.

Warianty usługi:

- Redukcja napletka łechtaczki, hoodoplastyka
- Korekta fałdów około łechtaczkowych, pseudohoodoplastyka
- Plastyka wędzidełka łechtaczki, frenuloplastyka




Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

Redukcja napletka łechtaczki, hoodoplastyka

Redukcja napletka łechtaczki polega na chirurgicznej korekcie tych tkanek. Efektem zabiegu jest odsłonięcie łechtaczki, umożliwiające jej stymulację, ale nie powodujące nieumyślnego drażnienia tej okolicy przez nadmierną redukcję. Zabieg hoodoplastyki często łączy się z plastyką warg sromowych mniejszych, które swój początek mają w fałdach około łechtaczkowych.

Usługa dokonywana w:

 Klinika Estetyki budynek Marriott



CZAS:
20 min



OBSZAR:
strefy intymne



ZNIECZULENIE:
miejscowe, ogólne,
podpajęczynówkowe



GRUPA WIEKOWA:
18+



CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:
30 min



ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:
3



CZAS HOSPITALIZACJI:
1 doba

Korekta fałdów około łechtaczkowych, pseudohoodoplastyka

Pseudohoodoplastyka jest rodzajem [labiominoroplastyki](#) i polega na chirurgicznym usunięciu nadmiaru tkanek z okolic łechtaczki, które zasłaniają ją i utrudniają jej stymulację. Różnica polega na tym, że tkanki nie są częścią napletka łechtaczki, a specyficznym uformowaniem warg sromowych mniejszych. Zabieg pseudohoodoplastyki przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym, a blizny ukrywa w naturalnych fałdach skórnych.



CZAS:
20 min



OBSZAR:
strefy intymne



ZNIECZULENIE:
miejscowe



GRUPA WIEKOWA:
18+



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

Usługa dokonywana w:

 Szpital LUX MED Puławska



CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:
30 min



ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:
3



CZAS HOSPITALIZACJI:
1 doba

Plastyka wędzidełka łechtaczki, frenuloplastyka

Plastykę wędzidełka łechtaczki wykonuje się, gdy doszło do jego uszkodzenia, na skutek czego łechtaczka jest skierowana niesymetrycznie w jednym kierunku. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Celem frenuloplastyki jest wycięcie zmienionych tkanek wędzidełka i ich ponowne połączenie wraz z przywróceniem funkcji.

Usługa dokonywana w:

 Szpital LUX MED Puławska



CZAS:
10 min



OBSZAR:
strefy intymne



ZNIECZULENIE:
miejscowe



GRUPA WIEKOWA:
18+



CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:
30 min



ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:
2

Jak przygotować się do zabiegu?

Plastykę okolic łechtaczki przeprowadza ginekolog plastyk po wcześniejszej konsultacji i kwalifikacji. W zależności od konkretnego przypadku stosuje się różne formy znieczulenia. Większość zabiegów wykonuje się w ramach chirurgii jednego dnia. Istnieje możliwość połączenia kilku procedur ginekologii plastycznej w trakcie jednego zabiegu - o ile lekarz nie zaleci inaczej. Procedury te u osób nieletnich przeprowadza się tylko za zgodą obydwójga rodziców, jeśli istnieją wskazania medyczne do ich wykonania. Po zabiegach



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

chirurgii intymnej zaleca się minimum 7 dni rekonwalescencji w warunkach domowych. Dla właściwego gojenia kluczowa jest higiena i wietrzenie rany. Pełen okres rekonwalescencji trwa 4-6 tygodni. Po tym czasie można wrócić do aktywności fizycznej i seksualnej. Zabiegu nie wykonuje się w trakcie miesiączki - pamiętaj o tym, planując termin przeprowadzenia procedury.



WSKAZANIA

Wskazaniem do zabiegu okolic łechtaczki jest przerost tkanek lub inna deformacja w tej okolicy. Zabiegi naprawcze wykonuje się również po nieudanych procedurach lub zabiegach na tle religijnym, polegających na amputacji warg sromowych mniejszych, a czasem większych.



PRZYGOTOWANIA

Na kilka dni przed zabiegiem należy odstawić leki rozrzedzające krew. Na dzień przed zabiegiem zaleca się wykonanie depilacji intymnej, umożliwiającej właściwą higienę rany.



PRZECIWWSKAZANIA

Bezwzględny przeciwwskazaniem do zabiegu są: ciąża i okres laktacji, nieprawidłowy wynik cytologii, schorzenia, w tym infekcje ginekologiczne wymagające leczenia w pierwszej kolejności, część chorób autoimmunologicznych, nieuregulowane choroby przewlekłe, uzależnienie od alkoholu i środków psychoaktywnych, duża skłonność do powstawania bliznowców lub nierealistyczne oczekiwania Pacjentki co do możliwych do uzyskania efektów zabiegu.

Przeciwwskazaniem do zabiegu są również: ogólny zły stan zdrowia, odchylenia w badaniach kontrolnych krwi, infekcja, w tym infekcje wirusowe, np. opryszczka.



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455