



Leczenie zaburzeń seksualnych

Zaburzenia seksualne wynikają zarówno z problemów i defektów intymnych, jak i urazów psychicznych czy zaburzeń emocjonalnych. Mogą być spowodowane spadkiem libido, a także odczuwaniem bólu fizycznego podczas zbliżeń. Pochwica to najbardziej znany rodzaj zaburzeń intymnych. Jego rozwiązania najczęściej podejmuje się ginekolog we współpracy z psychologiem. Ból podczas współżycia może wynikać ze zrostów poporodowych, a także suchości pochwy. W leczeniu kluczowa jest właściwa diagnoza i zastosowanie odpowiednich procedur

Warianty usługi:

- Terapia bólu w obszarze stref intymnych



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

Terapia bólu w obszarze stref intymnych

Ból w okolicach intymnych może mieć różne przyczyny. Najczęściej jest on wynikiem urazu mechanicznego lub porodu naturalnego, którego skutkiem są zrosty i blizny w części przedsionka pochwy i krocza. Najskuteczniejszą terapią w tym przypadku pozostaje podanie drogą iniekcji osocza bogatopłytkowego, pozyskanego z krwi żyłnej Pacjentki. Po właściwym odwirowaniu i uzupełnieniu o czynniki wzrostu, osocze podaje się w nadwrażliwe okolice, wymuszając przebudowę tkankową i regenerację. Terapia sprawdza się przy leczeniu pochwicy, vulvodynii, dyspareunii. Niekiedy jest tylko jednym z elementów leczenia.

Usługa dokonywana w:

 Szpital LUX MED Puławska



CZAS:
20 min



OBSZAR:
strefy intymne



ZNIECZULENIE:
ew. maść



LICZBA ZABIEGÓW:
1-2



ODSTĘPY POMIĘDZY ZABIEGAMI:
5-6 tygodni



GRUPA WIEKOWA:
18+



CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:
40 min



ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:
2

Jak się przygotować do konsultacji?

Konsultacja nie wymaga wcześniejszego przygotowania. W zależności od potrzeb Pacjentki odbywa się w parze lub indywidualnie.



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455