



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

Leczenie bruxizmu

Bruxizm, to mimowolna nadaktywność mięśni żwaczy. Występuje głównie podczas snu i objawia się jako zgrzytanie zębami. Skutkiem jest ścieranie się zębów, ból w okolicach mięśni żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych i przerost mięśni, zaburzający proporcje twarzy. Jednym ze sposobów leczenia bruxizmu jest zabiegowe osłabienie mięśni żwaczy, chroniąc stawy skroniowo-żuchwowy przed przeciążeniem.


Warianty usługi:

- Leczenie zgrzytania zębami botoksem

Leczenie zgrzytania zębami botoksem

Polega na wstrzyknięciu toksyny do każdego mięśnia żwacza, zazwyczaj w 2-3 punktach, symetrycznie po obu stronach twarzy. Botulina poprzez swoje działanie na połączenia nerwowo-mięśniowe osłabia skurcz mięśni żwaczy, dzięki czemu dochodzi do zniwelowania nadmiernego zaciskania zębów. Efekt zaczyna być odczuwalny po kilku, kilkunastu dniach i utrzymuje się przez 3-10 miesięcy.

Usługa dokonywana w:

 Klinika Estetyki budynek Marriott

 Szpital LUX MED Puławska



KOSZT:
1000 zł



CZAS:
20 min



OBSZAR:
twarz



CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:
30 min



ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:
1

Jak przygotować się do zabiegu?

Sam zabieg podania toksyny botulinowej nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Konieczna jest jedynie wcześniejsza konsultacja stomatologiczna w celu oceny wad zgryzu i zastosowania typowego w takich przypadkach postępowania stomatologicznego.



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455



WSKAZANIA

Wskazaniem do podania botoksu w leczeniu bruksizmu jest nadmierna aktywność mięśni żwaczy, przerost mięśni żwaczy.



PRZECIWWSKAZANIA

Zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego: Miastenia gravis, zespół Lamberta-Eatona, schorzenia o podłożu nerwowo-mięśniowym, nowotworowym, przewlekłe schorzenia autoimmunologiczne, sercowo-naczyniowe, nadwrażliwość na albuminy ludzkie, białko jaja kurzego, ciąża, karmienie piersią, infekcje skóry w miejscu zabiegu, przyjmowanie aminoglikozydów, aminochinolonów, D penicylaminy, cyklosporyny, sukcylocholiny, tubokuraryny, linkomycyny, polimyksyny i antagonistów kanałów wapniowych do 2 tygodni przed zabiegiem oraz leków obniżających krzepliwość krwi.

