



Leczenie migreny

Migrena objawia się silnym, zwykle jednostronnym, pulsującym bólem głowy, zlokalizowanym w okolicy skroni, czoła, niekiedy zachodzącym aż za oczodoły, połączonym z nudnościami, wymiotami, zaburzeniami widzenia, często z nadwrażliwością na światło i dźwięk. Ból czasami poprzedzony jest aurą- objawami wzrokowymi, słuchowymi lub czuciowymi, występującymi ok. 20-30 minut wcześniej. Rozpoznanie migreny i kwalifikacja do leczenia powinny być ustalone przez neurologa.

Warianty usługi:

- Leczenie migreny przewlekłej z wykorzystaniem botoksu




Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

Leczenie migreny przewlekłej z wykorzystaniem botoksu

Podanie botoksu za pomocą iniekcji cienką igłą w okolice czoła, skroni, potylicy i karku, zgodnie z przyjętym postępowaniem, określonym w protokole PREEMPT (od 31 punktów iniekcji). Działanie przeciwbólowe wynika z hamowania zakończeń nerwowych oraz hamowania uwalniania neurotransmiterów i neuropeptydów, co blokuje przewodnictwo bólu. Dla oceny skuteczności leczenia zaleca się powtórzenie zabiegu co najmniej trzykrotnie w odstępie 12 tygodni.

Pierwszy efekt można odczuć już po około tygodniu. Warto wiedzieć, że jest to skuteczna metoda leczenia - w 80% przypadków bóle ustępują lub zmniejszają się w stopniu umożliwiającym prowadzenie normalnej aktywności życiowej.

Usługa dokonywana w:

 Klinika Estetyki budynek Marriott

 Szpital LUX MED Puławska

Jak przygotować się do zabiegu?

Zabieg nie wymaga specjalnego przygotowania.



WSKAZANIA

Konieczne jest rozpoznanie migreny przewlekłej postawione przez neurologa, wykluczające inne przyczyny bólu głowy.









PRZECIWWSKAZANIA

Zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego: Miastenia gravis, zespół Lamberta-Eatona, schorzenia o podłożu nerwowo-mięśniowym, nowotworowym, przewlekłe schorzenia autoimmunologiczne, sercowo-naczyniowe, nadwrażliwość na albuminy ludzkie, białko jaja kurzego, ciąża, karmienie piersią, infekcje skóry w miejscu zabiegu, przyjmowanie aminoglikozydów, aminochinolonów, D penicylaminy, cyklosporyny, sukcyńlocholiny, tubokuraryny, linkomycyny, polimyksyny i antagonistów kanałów wapniowych do 2 tygodni



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

	KOSZT: 2000 zł
	CZAS: 30 min
	OBSZAR: głowa
	GRUPA WIEKOWA: 25+
	CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM: 60 min
	ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU: 1

przed zabiegiem oraz leków obniżających krzepliwość krwi.



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455