



**Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79**  
**Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455**



**Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79**  
**Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455**

## Leczenie nadpotliwości

Nadpotliwość objawia się nadmiernym poceniem, najczęściej w okolicach pach, rąk i stóp, rzadziej czoła, grzbietu, owłosionej skóry głowy. Ta krępująca dolegliwość negatywnie wpływa na samopoczucie, utrudnia pracę zawodową i jest problemem w kontaktach międzyludzkich. Zabieg jest sprawdzonym, skutecznym sposobem czasowego zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania pocenia się w okolicy poddanej zabiegowi.


## Warianty usługi:

- Leczenie nadpotliwości z wykorzystaniem toksyny botulinowej

## Leczenie nadpotliwości z wykorzystaniem toksyny botulinowej

Podanie botuliny blokuje zakończenia nerwowe gruczołów potowych, hamując ich pracę. Zmniejszenie wydzielania potu następuje po około 5 dniach, a pełny efekt zabiegu widoczny jest po około 14 dniach i utrzymuje się przez 6-10 miesięcy. Wykonanie zabiegu jest zwykle poprzedzone testem jodowo-skrobiowym Minora. Skórę smarujemy roztworem jodyny i posypujemy skrobią ziemniaczaną. Miejsca nasilonego pocenia wybarwiają się ciemniejszym kolorem. W tym obszarze wyznaczamy punkty wkłuć i cienką igłą, śródskórnice, w każdy punkt podajemy odpowiednią ilość toksyny.

### Usługa dokonywana w:

 Klinika Estetyki budynek Marriott

 Szpital LUX MED Puławska



**KOSZT:**  
2000 zł



**CZAS:**  
20 min



**OBSZAR:**  
pachy, dłonie, stopy



**ZNIECZULENIE:**  
maść



**LICZBA ZABIEGÓW:**  
1-2



**ODSTĘPY POMIĘDZY ZABIEGAMI:**  
2 tygodnie



**CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:**  
60 min



**Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79**  
**Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455**



**ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:**  
1

## Jak przygotować się do zabiegu?

Leczenie nadpotliwości nie wymaga specjalnego przygotowania. Podczas konsultacji przed zabiegiem pacjent zostaje poinformowany o rodzaju znieczulenia, sposobie wykonania zabiegu, ryzyku z nim związanym i postępowaniu pozabiegowym.



### **WSKAZANIA**

Nadpotliwość pach, dłoni, stóp i innych okolic ciała.



### **PRZYGOTOWANIA**

W leczeniu nadpotliwości pach ułatwieniem będzie wygolenie owłosienia na dzień przed zabiegiem. W przypadku nadpotliwości stóp usunięcie nadmiaru zrogowaciałej skóry, również na dzień przed zabiegiem. W dniu zabiegu i dwa dni po nim zalecana jest ochrona przed przegrzaniem oraz nadmiernym moczeniem. Wskutek podania toksyny botulinowej może wystąpić niewielki obrzęk, zaczerwienienie i lokalne, przemijające osłabienie mięśni.



### **PRZECIWWSKAZANIA**

Zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego: Miastenia gravis, zespół Lamberta-Eatona, schorzenia o podłożu nerwowo-mięśniowym, nowotworowym, przewlekłe schorzenia autoimmunologiczne, sercowo-naczyniowe, nadwrażliwość na albuminy ludzkie, białko jaja kurzego, ciąża, karmienie piersią, infekcje skóry w miejscu zabiegu, przyjmowanie aminoglikozydów, aminochinolonów, D penicylaminy, cyklosporyny, sukcylocholiny, tubokuraryny, linkomycyny, polimyksyny i antagonistów kanałów wapniowych do 2 tygodni przed zabiegiem oraz leków obniżających krzepliwość krwi.



**Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79**  
**Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455**