



Leczenie nadpotliwości

Nadpotliwość objawia się nadmiernym poceniem się pach, rąk lub stóp. Ta krępująca dolegliwość negatywnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Zabieg blokujący pocenie to sprawdzony sposób na zmniejszenie lub całkowite ograniczenie pocenia się w okolicy poddanej zabiegowi.

Warianty usługi:

- Leczenie nadpotliwości z wykorzystaniem toksyny botulinowej

Leczenie nadpotliwości z wykorzystaniem toksyny botulinowej


Podanie botuliny blokuje zakończenia nerwowe gruczołów



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

potowych, hamując ich pracę. Zmniejszenie wydzielania potu następuje po około 5 dniach, a pełny efekt zabiegu widoczny jest po około 14 dniach i utrzymuje się przez 6-10 miesięcy. Wykonanie zabiegu jest zwykle poprzedzone testem jodowo-skrobiowym Minora. Skórę smarujemy roztworem jodyny i posypujemy skrobią ziemniaczaną. Miejsca nasilonego pocenia wybarwiają się ciemniejszym kolorem. W tym obszarze wyznaczamy punkty wkłuć i cienką igłą, śródskórną, w każdy punkt podajemy odpowiednią ilość toksyny.

Usługa dokonywana w:

 Klinika Estetyki budynek Marriott

 Szpital LUX MED Puławska



KOSZT:
2000 zł



CZAS:
20 min



OBSZAR:
pachy, dłonie, stopy



ZNIECZULENIE:
maść



LICZBA ZABIEGÓW:
1-2



ODSTĘPY POMIĘDZY ZABIEGAMI:
2 tygodnie



CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:
60 min



ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:
1



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

Jak przygotować się do zabiegu?

Leczenie nadpotliwości nie wymaga specjalnego przygotowania. Podczas konsultacji przed zabiegiem pacjent zostaje poinformowany o sposobie wykonania zabiegu, ryzyku z nim związanym i postępowaniu pozabiegowym.



WSKAZANIA

Nadpotliwość pach, dłoni, stóp i innych okolic ciała.



PRZYGOTOWANIA

W leczeniu nadpotliwości pach ułatwieniem będzie wygolenie owłosienia na dzień przed zabiegiem. W przypadku nadpotliwości stóp usunięcie nadmiaru zrogowaciałej skóry, również na dzień przed zabiegiem. W dniu zabiegu i dwa dni po nim zalecana jest ochrona przed przegrzaniem oraz nadmiernym moczeniem. Wskutek podania toksyny botulinowej może wystąpić niewielki obrzęk, zaczerwienienie i lokalne, przemijające osłabienie mięśni.



PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazaniem do zabiegu są zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego: Miastenia gravis, zespół Lamberta-Eatona, schorzenia o podłożu nerwowo-mięśniowym, nowotworowym, przewlekłe schorzenia autoimmunologiczne, sercowo-naczyniowe, nadwrażliwość na albuminy ludzkie, białko jaja kurzego, infekcje skóry w miejscu zabiegu, przyjmowanie aminoglikozydów, aminochinolonów, D penicylaminy, cyklosporyny, sukcylocholiny, tubokuraryny, linkomycyny, polimyksyny i antagonistów kanałów wapniowych do 2 tygodni przed zabiegiem oraz leków obniżających krzepliwość krwi.



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455